

試験問題		試験日	曜日	時限	担当者
科目名	数学 II	2018年7月27日	金	2	田崎

答えだけではなく、考え方や計算の筋道を簡潔に書くこと（単純な計算問題は答えだけでもいいが）。解答の順番は（0番以外）自由。解答用紙の裏面も使用してよい。試験後、答案を受け取りにくること。2018年10月を過ぎたら、答案を予告なく処分する。

0. これは冒頭に書くこと。レポートの提出や修正の状況を書け（冒頭に何も記述がなければ、レポートは提出していないとみなす）。レポートは、返却済みのものも新規のものも、今日的答案にはさんで提出すること。

1. $m > 0, t_0 > 0, f_0$ を実定数とする。一次元運動のニュートン方程式

$$m \frac{d^2}{dt^2} x(t) = \begin{cases} f_0(t_0 - t), & 0 \leq t \leq t_0 \\ 0, & t \geq t_0 \end{cases}$$

の一般解を求めよ。ただし、任意定数として $x(0)$ と $v(0) := \dot{x}(0)$ を使え。

2. γ, α, β を実定数とする。常微分方程式

$$\frac{d}{dt} x(t) = -\gamma x(t) + \alpha + \beta t \quad (1)$$

の一般解を以下の手順にしたがって求めよ。

- (a) $\alpha = 0, \beta = 0$ とした斉次の常微分方程式の一般解を求めよ。
- (b) 微分方程式 (1) の特解で $x_{ps}(t) = A + Bt$ と書けるものを求めよ (A, B は求めるべき定数)。
- (c) (a) と (b) での解を足して (1) の一般解を求めよ。任意定数を初期値 $x(0)$ を用いて表わせ。

3. α, β を正の定数とする。以下の常微分方程式の一般解を求めよ ((a) では $x(t) > 0$ とする)。任意定数として初期値 $x(0)$ を使え。

$$(a) \frac{dx(t)}{dt} = \frac{\alpha \cos(\beta t)}{x(t)} \quad (b) \frac{dx(t)}{dt} = (\alpha + \beta t)(1 + \{x(t)\}^2) \quad (2)$$

4. α, β を定数とし、常微分方程式

$$\frac{dx(t)}{dt} = \alpha t^2 x(t) + \beta \exp\left[\frac{\alpha}{3} t^3\right] \quad (3)$$

を次の手順（定数変化法）で解け。

- (a) 解を $x(t) = C(t) \exp\left[\frac{\alpha}{3} t^3\right]$ という形に書き、 $C(t)$ が満たす微分方程式を求めよ。
- (b) $C(t)$ についての微分方程式の一般解を求め、(3) の一般解を求めよ。任意定数は初期値 $x(0)$ で表わせ。

5. x, z 軸の回りの θ の回転はそれぞれ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

という行列で表わされる。(a) x 軸回りに $\pi/2$ 回転したあと z 軸回りに $\pi/2$ の回転、および、(b) z 軸回りに $\pi/2$ 回転したあと x 軸回りに $\pi/2$ の回転を表わす行列を求めよ。それぞれの回転で点 (a, b, c) がどの点に移されるかを求めよ。

6. 計算せよ。

$$(a) \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{2}i \\ \sqrt{2} - i \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{2}i \\ \sqrt{2} + 2i \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & 7 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$(c) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (d) \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} (1 \ y \ y^2)$$

7. A, B を任意の（複素数を成分にもつ） $d \times d$ 行列とするととき、

$$\text{Tr}[AB] = \text{Tr}[BA] \quad (4)$$

が成り立つことを証明せよ。